

<h2>&#id&#iologie</h2> <p>C'est une Infection bactérienne principalement due à la Salmonella typhi.</p> <p>Transmission fœto-orale :</p> Alimentation : crudités, fruits de mer, boissons non surveillées (glaçons). Rôle des "porteurs sains" dans la diffusion de la maladie. <p>La maladie est quasiment absente dans les pays développés, mais elle reste fréquente dans les autres. Sa prévalence est importante en Asie du sud-est et centrale et en Afrique du sud. Le germe le plus souvent responsable reste Salmonella typhi, près de 10 fois plus retrouvées que les Salmonella paratyphi.</p> <h2>Manifestation clinique</h2> <p>La durée d'incubation est de 10 à 15 jours.</p> <p>Typiquement : diarrhée fuligineuse avec troubles de la conscience.</p> <p>Nombreuses formes atteintes.</p> <p>Risque de complications digestives, neurologiques ou cardiaques.</p> <p>Pas d'immunisation durable au cours d'une fièvre typhoïde.</p> <h2>Extension graphique</h2> <p style="text-align: center;"></p> L'endémie : ? Zones de forte endémie ? Zones de moyenne endémie ? Zones de cas sporadiques <p>Pays traversés où le risque est élevé :</p> Bangladesh Inde Iran Ouzbékistan Pakistan Tadjikistan Turkménistan <p>Pays traversés où le risque est modéré :</p> Albanie Cambodge Chine Grèce Laos Macédoine Moldavie Myanmar

RoumanieRussieSerbieTha  andeTurquieUkraineVi  Nam <h2>Vaccination</h2> <h3>Modalit  </h3> 1 injection intramusculaire. Validit  : au moins 3 ans. Vaccination non recommand  avant 2 ans (maladie exceptionnelle chez le nourrisson, efficacit  non d ontr  du vaccin). Entre 2 et 5 ans, la vaccination est discut  en fonction du risque  pid iologique (r ponse en anticorps des enfants de moins de 5 ans mal connue). <h3>Effets secondaires</h3> L ve douleur locale dans les 24 heures suivant l'injection. Rare rougeur ou induration locale. Dans 1%  5% des cas, fi re mod . <h3>Contre-indications</h3> Hypersensibilit  un composant du vaccin. D onseill  pendant la grossesse ou l'allaitement en raison du manque d udes. <h3>Associations de vaccins</h3> Administration simultan  (en des points diff ents) possible avec T anos, Polio, H atite A et H atite B. Administration conjointe (en 1 seule injection) avec les vaccins anti-m ningococciques A+C, Fi re Jaune et Rage. <h2>Ressources</h2> CHU de Rouen, conseils de sant  pour toutes les personnes se rendant  l  ranger. Comit  d Informations M dicales, l'information des voyageurs et des expatri . Wikip ia, l'encyclop ie libre et gratuite.