<h2>*oid*iologie</h2> L'enc*halites *tiques est une arbovirose (maladie virale transmise par les insectes) transmise par les morsures de tiques. Il existe deux formes : Enc&halite de la Ta&a en Russie europ&nne et Asiatique.Enc&halite &Tiques d'Europe Centrale avec un réervoir de virus constitué par les rongeurs, les rennes et les moutons.

L'&id&ie est verno-estivale (printemps et && avec un risque maximal en for te en campagne. de la tique, il est donc recommand@de rechercher syst@atiquement sur soi la pr@ence de tiques apro toute randonno. m�ingo-enc�halite virale �oluant en trois phases : li>lncubation de 1 �2 semaines.
li>Dout brutal avec fiore, frissons et maux de toe.
li>Apparition secondaire de signes neurologiques : prostration ou agitation, troubles de conscience, troubles du tonus, paralysies flasques. l@alit@est @ev@. <h2>Extension g@graphique</h2> Leende : ? Pays concerne par la Pays travers oo le risque existe : o <a</p> href="index.php?view=article&catid=34%3Aeurope-du-sud&id=48%3Aalbanie&option=com_con_ tent&Itemid=54">Albanie href="index.php?view=article&catid=34%3Aeurope-du-sud&id=55%3Acroatie&option=com_cont_ ent&Itemid=54">Croatie href="index.php?view=article&catid=34%3Aeurope-du-sud&id=63%3Amacedoine&option=com content&Itemid=54">Mac@oine href="index.php?option=com_content&view=article&id=73:russie&catid=35:europe-de-lest&Item id=77">Russie href="index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=72">Serbie href="index.php?view=article&catid=34%3Aeurope-du-sud&id=75%3Aslovenie&option=com_co ntent&Itemid=54">Slov�ie la vaccination, en cas d'exposition rente (morsure de tiques de moins de 4 jours), une protection passive par immunoglobulines peut re propose. (Autriche notamment mais aussi sous condition en France). inactiv♦inject♦par voie intramusculaire (Ticovac♦). Le protocole vaccinal associe 3 injections, la seconde 1 ♦3 mois apr♦ la premi♦e, la troisi♦e 9 ♦12 mois apr♦ la seconde. Les injections suivantes ont lieu tous les 3 ans. concern . Eviter de vacciner les enfants de moins de 1 an. entre +2&C et +8&C. <h3>Associations vaccinales</h3> Par manque de recul, ♦iter les associations d'autres vaccins avec Ticovac ♦. <h3>Effets ind ♦irables</h3> Possibilit de rection locale sur la zone d'injection, voire rection ganglionnaire locale. Parfois, chez les enfants, dans les 24 heures, fire \$38\$, naus\$s, vomissements. Dur\$ 24 heures./ul> <h3>Contre-indications</h3> Eviter de vacciner les sujets allergiques aux protones de loouf.

preentions consistent essentiellement ecombattre et repousser la tique. Des informations plus

href="index.php?option=com_content&view=article&id=106:les-tiques&catid=44:insectes&Itemi

préises sont disponibles dans la rubrique sur les <a

1/2

d=63">tiques. <h2>Ressources</h2> <a title="Fiche d@aill@ du CIMED sur les maladies du pays"

href="http://www.cimed.org/index.php/cimed_fr/Questions-de-sante/Autres-maladies-infectieuse s/L-Encephalites-a-tiques" class="lien_ext">Comit�d�Informations M�icales, l'information des voyageurs et des expatri�.
li><a title="Fiche d�aill� du CHU de Rouen sur les maladies du pays"

href="http://www3.chu-rouen.fr/Internet/services/sante_voyages/pathologies/encephalitetiques/" class="lien_ext">CHU de Rouen, conseils de sant@pour toutes les personnes se rendant @I'@ranger.